

# ПРОФИЛАКТИКА ЖЕЛТОЙ ЛИХОРАДКИ

**Желтая лихорадка** – острое вирусное геморрагическое заболевание, передаваемое инфицированными комарами.

«Желтой» она называется из-за того, что у некоторых пациентов развивается желтуха.

## **Симптомы:**

- высокая температура;
- головная боль;
- желтуха;
- миалгия;
- тошнота;
- рвота;
- усталость.

**Передача инфекции:** основными переносчиками являются комары.

## **Существует три типа циклов передачи инфекции:**

– *лесная желтая лихорадка:* во влажных тропических лесах (инфицированные комары кусают людей, работающих или находящихся в лесах);

– *промежуточная желтая лихорадка:* полудомашние комары (те, что размножаются как в дикой природе, так и вблизи жилищ) Самый распространенный тип вспышки болезни в Африке;

– *городская желтая лихорадка:* инфицированные люди заносят вирус в густонаселенные районы с высокой плотностью популяции комаров и низким или нулевым иммунитетом к этой болезни.

## **Группы риска:**

Сорок семь стран – в Африке (34) и Центральной и Южной Америки (13) – либо эндемичны, либо имеют в своем составе регионы, эндемичные по желтой лихорадке.

## **Профилактика:**

– *вакцинация* – основной способ профилактики желтой лихорадки (учреждение здравоохранения «19-я центральная районная поликлиника Первомайского района г. Минска»);

– *борьба с комарами* – переносчиками заболевания.

*Источник: официальный сайт  
Всемирной организации здравоохранения  
<https://www.who.int/ru>*